

---

## ACIDO BÓRICO 5%, gotas óticas

### COMPOSICIÓN

Ácido bórico.....	2,5 g
Agua destilada.....	14 ml
Alcohol 96°.....	35 ml

#### Conservación

Protegido de la luz

#### Caducidad

3 años

#### Administración

Tópica

### MODUS OPERANDI

- 1.- Mezclar el alcohol y el agua. Llevar al agitador magnético.
- 2.- Añadir el ácido bórico lentamente y dejar 5' en agitación.
- 3.- Filtrar.

### INDICACIONES

Otitis externa aguda difusa. Bacteriostático y antifúngico.

### OBSERVACIONES

Por vía oral es tóxico.

No debe usarse en niños menores de 3 años o cuando existan heridas abiertas en la piel del conducto auditivo externo.

También se emplea con alcohol absoluto en eczemas para obtener un efecto secante.

### BIBLIOGRAFÍA

- 1.- Reynolds JEF, editor . Martindale. The Extra Pharmacopoeia. 29th ed, London: The Pharmaceutical Press,1989.
- 2.- Llopis Clavijo MJ, Baixauli Comes V. La Formulación Magistral en la Oficina de Farmacia 1º Parte.Valencia, 1981.
- 3.- Budavari S, editor. The Merck Index. 11th ed. Rahway: Merck & Co,1989.
- 4.- Schroeder SA, Krupp MA, Tierney LM, McPhee SJ, editores. Diagnostico Clínico y Tratamiento. 26ºed. México: El Manual Moderno, 1991.
- 5.- Atienza Fernández M, Lluch Colomer A, Martínez Atienza J y Santos Rubio MD. Formulación en Farmacia Pediátrica. 1ª Ed: Litografía Sevillana. 2001.
- 6.- Atienza Fernández M, y Martínez Atienza J. Formulación en Farmacia Pediátrica. 2ªEd: Litografía Sevillana. 2002.