
ANFOTERICINA B para inhalación

COMPOSICIÓN

Anfotericina B100 mg
Agua para inyección,100 ml

MODUS OPERANDI

Trabajar en campana de flujo laminar.

- 1.- Reconstituir cada vial liofilizado de 50 mg de Anfotericina B (Ver observaciones), con 10 ml de agua para inyección, que se sacarán del vial de 100 ml.
- 2.- Agitar hasta su total disolución.
- 3.- Adicionar ambos viales reconstituidos al vial de agua de 100 ml.

INDICACIONES

Endoftalmitis por Cándida, queratitis.

OBSERVACIONES

Hasta la fecha, la anfotericina B como materia prima, no es posible adquirirla en el mercado, por ello, nos vemos obligados a efectuar esta fórmula a partir de la especialidad: Fungizona® vial 50 mg.

La anfotericina B no debe ser filtrada por filtros de 0.22 micras. Aunque podría recomendarse la filtración de la solución reconstituida sin embargo, no es conveniente por disminuir la concentración del principio activo.
Se inactiva a pH bajo.

BIBLIOGRAFÍA

- 1.- Información suministrada por el Servicio de Farmacia del Hospital Materno Infantil Vall D´Hebron. Barcelona

Conservación

Refrigerado, protegido de la luz y el aire

Caducidad

1 mes

Administración

Inhalada