
AZATIOPRINA suspensión 10 mg/ml

COMPOSICIÓN

Azatioprina1 g
Vehículo para suspensiones c.s.p.....100 ml

MODUS OPERANDI

- 1.- Humedecer los comprimidos de Imurel® (Ver observaciones) en el mortero con una pequeña cantidad de vehículo para suspensiones. Triturar.
- 2.- Añadir pequeñas cantidades de la misma solución hasta formar una pasta suave.
- 3.- Adicionar más solución hasta formar una pasta líquida.
- 4.- Transferir al vaso de precipitado. Utilizar pequeñas cantidades, el suficiente número de veces para arrastrar los restos que quedasen en el mortero.
- 5.- Completar con solución de vehículo para suspensiones hasta un volumen final de 100 ml.
- 6.- Agitar a velocidad suave no superior a 1000 r.p.m.
- 7.- Envasar en frascos topacio de 60 ml, dejando el suficiente espacio para su posterior agitación.
- 8.- Etiquetar.

INDICACIONES

Inmunosupresor indicado en trasplantes y enfermedades autoinmunes.

OBSERVACIONES

Hasta la fecha, la azatioprina como materia prima, no es posible adquirirla en el mercado, por ello, nos vemos obligados a efectuar esta fórmula a partir de la especialidad: Imurel® comp 50 mg.

Usar guantes y mascarilla durante la preparación y terminada ésta asegurarse bien, de haber dejado completamente limpia la superficie de trabajo.

En el etiquetado deberá figurar: "Agitar antes de usar", además del lote, caducidad, conservación en frigorífico, protección de la luz y que contiene sacarosa (0,4 g/ml).

BIBLIOGRAFÍA

- 1.- San Miguel MT, Vila N, Najera MD, Alonso JM. Manual de Formulaciones pediátricas orales. Hospital Arrixaca. Murcia. 1997.
- 2.- Int J Pharm Comp, vol I, nº 2, pág 102, 1997
- 3.- Hospital Sick Children, Department of Pharmacy, Toronto, 2000
- 4.- Atienza Fernández M, y col. Formulación en Farmacia Pediátrica. Ed: Litografía Sevillana. 2001.
- 5.- Atienza Fernández M, y Martínez Atienza J. Formulación en Farmacia Pediátrica. 2ªEd: Litografía Sevillana. 2002.
- 6.- Drugdex evaluations. Micromedex® Healthcare Series, Vol. 123, 2005.

Conservación

Refrigerado, protegido de la luz

Caducidad

2 meses

Administración

Oral

Membrete
o sello de la Farmacia

AZATIOPRINA suspensión 10 mg/ml

INFORMACIÓN AL PACIENTE

INDICACIONES

- *Inmunosupresor indicado en trasplantes y enfermedades autoinmunes (artritis reumatoide, lupus, anemia hemolítica...).*

CONSERVACIÓN

- *Refrigerado. Mantenga siempre el medicamento en el envase original bien cerrado.*

MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS QUE NO DEBE TOMAR

- *Indique a su médico si está en tratamiento con alopurinol o con cualquier corticoesteroide como la prednisona.*
- *No interfiere con los alimentos.*

¿CÓMO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

- *Se recomienda tomar la azatioprina con alimentos para disminuir las molestias digestivas.*
- *Si toma más de una dosis al día y olvida tomar una dosis tómela tan pronto como se acuerde aunque quede poco tiempo para la próxima administración. En caso de tomar una sola dosis diaria ignore la dosis olvidada.*
- *Agite bien el medicamento antes de administrarlo.*

¿CUÁNDO NO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

- *Cuando haya experimentado alguna reacción alérgica a cualquier fármaco (consulte a su médico).*
- *Cuando esté embarazada o sospeche que pueda estarlo.*

PRECAUCIONES

- *Se recomienda el uso de anticonceptivos en mujeres de edad fértil. Posibles riesgos para el feto especialmente durante el 1er trimestre del embarazo.*
- *En madres lactantes, a causa del potencial de efectos adversos graves para el lactante, se recomienda suspender la lactancia materna o evitar la administración del fármaco.*
- *Este medicamento contiene sacarosa como excipiente, por lo que deberá ser tenido en cuenta en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, problemas de absorción de glucosa, deficiencia de sacarasa-isomaltasa y pacientes diabéticos.*

EFFECTOS ADVERSOS

- *Anorexia, náuseas, vómitos, anemia, leucopenia e infección.*

RECOMENDACIONES

- *Este medicamento es inmunosupresor por lo que aumenta la probabilidad de aparición de infecciones. Consulte a su médico si aparecen síntomas de infección (fiebre o escalofríos), dolor de estómago, náuseas, vómitos, dolor muscular y/o hematomas.*