
BACLOFENO 5 mg/ml

COMPOSICIÓN

Baclofeno.....	300 mg
Glicerina o agua destilada c.s.p.	
Metilcelulosa al 1%.....	15 ml
Jarabe simple c.s.p.....	60 ml

Conservación

Refrigerado, protegido de la luz

Caducidad

1 mes

Administración

Oral

MODUS OPERANDI

- 1.- Triturar los comprimidos de Lioresal® (Ver observaciones).
- 2.- Pasar el polvo por un tamiz de 9 cm de diámetro y 0,25 mm de luz.
- 3.- Verter el polvo en el vaso de precipitado aforado a 60 ml.
- 4.- Añadir unas gotas de glicerina o el agua hasta formar una pasta espesa.
- 5.- Adicionar la metilcelulosa, poco a poco y agitando.
- 6.- Completar con el jarabe simple hasta un volumen final de 60 ml.
- 7.- Agitar a velocidad suave no superior a 3000 r.p.m.
- 8.- Envasar en frascos topacio de 60 ml, dejando el suficiente espacio para su posterior agitación.
- 9.- Etiquetar.

INDICACIONES

Relajante muscular, derivado del ácido gammaaminobutírico(GABA). Tratamiento de espasmos musculares de origen diverso.

OBSERVACIONES

Hasta la fecha, el baclofeno como materia prima, no es posible adquirirlo en el mercado, por ello, nos vemos obligados a efectuar esta fórmula a partir de la especialidad: Lioresal ® comp 25 mg.

En el etiquetado deberá figurar: "Agitar antes de usar", el lote, caducidad , conservación en frigorífico y que contiene sacarosa (0,7 g/ml).

BIBLIOGRAFÍA

- 1.- Drugdex evaluations. Micromedex® Healthcare Series, Vol. 123, 2005.

Membrete
o sello de la Farmacia

BACLOFENO suspensión 5 mg/ml

INFORMACIÓN AL PACIENTE

INDICACIONES

- *Relajante muscular. Tratamiento de espasmos musculares de origen diverso.*

CONSERVACIÓN

- *Refrigerado y protegido de la luz.*

MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS QUE NO DEBE TOMAR

- *Puede interactuar con otros depresores del sistema nervioso (incluyendo los medicamentos contra la alergia o el resfriado), con litio o ibuprofeno*
- *Los alimentos no interfieren en su absorción.*

¿CÓMO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

- *Administrar el medicamento con las comidas, acompañándolo con leche para facilitar la tolerancia gastrointestinal.*
- *Agite bien el medicamento antes de administrarlo.*
- *Si olvida tomar una dosis tómela tan pronto como se acuerde, salvo que quede poco tiempo para la próxima administración, es ese caso ignore la dosis olvidada.*

¿CUÁNDO NO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

- *Cuando haya sufrido previamente una reacción alérgica a baclofeno.*
- *Cuando padezca epilepsia.*

PRECAUCIONES

- *El uso del baclofeno es compatible con la lactancia materna, sin embargo su uso durante el embarazo sólo se acepta en caso de ausencia de alternativas terapéuticas más seguras.*
- *Insuficiencia renal: puede ser necesario un ajuste de dosis.*
- *Diabetes: puede aumentar las concentraciones de glucosa en sangre.*
- *Este medicamento contiene sacarosa como excipiente, por lo que deberá ser tenido en cuenta en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, problemas de absorción de glucosa, deficiencia de sacarasa-isomaltasa y pacientes diabéticos.*

EFECTOS ADVERSOS

- *Afectan fundamentalmente al sistema nervioso central siendo el efecto más frecuente la aparición de somnolencia pasajera.*
- *Con menor frecuencia pueden aparecer náuseas, mareos, cefalea, fatiga o depresión.*

RECOMENDACIONES

- *Se recomienda interrumpir el tratamiento de forma gradual. La suspensión brusca de tratamientos prolongados con baclofeno se ha asociado con un síndrome de abstinencia (convulsiones, ansiedad, confusión).*