

---

## BECLOMETASONA emulsión 0,5 mg/ml

### COMPOSICIÓN

Beclometasona dipropionato.....250 mg  
Lecitina de soja fluída.....10 g  
Aceite de oliva c.s.p.....500 ml

#### Conservación

T<sup>a</sup> ambiente, proteger de la luz

#### Caducidad

1 mes

#### Administración

Oral

### MODUS OPERANDI

- 1.- Pesar la beclometasona, teniendo en cuenta la riqueza del lote.
- 2.- Disolverla en la lecitina de soja.
- 3.- Añadir el aceite de oliva y agitar hasta homogeneización de la mezcla.
- 4.- Envasar y mantener bien cerrado el frasco.

### INDICACIONES

Tratamiento de EICH ( enfermedad injerto contra huésped) intestinal en pacientes con TAMO.

La dosis habitual es 2 mg/6 h durante 28 días.

### OBSERVACIONES

Calentando ligeramente, se favorece la formación de emulsión de la mezcla.

Puede envasarse en botella de plástico topacio de 500 ml.

En la etiqueta deberá figurar el lote, la caducidad, la protección de la luz y que contiene lecitina de soja (20 mg/ml).

La estabilidad que indicamos, está basada en la bibliografía encontrada para formulaciones similares.

### BIBLIOGRAFÍA

- 1.- Am J Gastroenterol 1997, 92:147-9 (380228- IOWA).
- 2.- Martindale. The complete Drug Reference, 32 ed. Pharmaceuticals Press. Massachusetts.1999; 1032.
- 3.- Drugdex evaluations. Micromedex® Healthcare Series, Vol 123, 2005.

---

Membrete  
o sello de la Farmacia

## **BECLOMETASONA emulsión oleosa 0,5 mg/ml**

### **INFORMACIÓN AL PACIENTE**

#### **INDICACIONES**

- *Tratamiento de EICH (enfermedad del injerto contra el huésped) en pacientes con TAMO (transplante de médula ósea).*

#### **CONSERVACIÓN**

- *A temperatura ambiente protegido del calor y la luz directa.*

#### **MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS QUE NO DEBE TOMAR**

- *Indique a su médico si está en tratamiento con otros fármacos.*
- *No interfiere con los alimentos.*

#### **¿CÓMO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?**

- *Para mejorar la aceptación del fármaco, debido a su consistencia oleosa, se recomienda la administración con alimentos: por ejemplo empapando un trozo de pan con la solución.*
- *Si olvida tomar una dosis tómela tan pronto como se acuerde, salvo que quede poco tiempo para la próxima administración, es ese caso ignore la dosis olvidada.*

#### **¿CUÁNDO NO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?**

- *Cuando haya sufrido previamente una reacción alérgica a la beclometasona.*

#### **PRECAUCIONES**

- *En madres lactantes se recomienda la suspensión de la lactancia materna o evitar la administración del medicamento. Su uso durante el embarazo sólo se acepta en caso de ausencia de alternativas terapéuticas más seguras, aunque el fármaco ha sido ampliamente utilizado sin aparentes consecuencias perjudiciales.*
- *En niños con tratamientos prolongados se recomienda una monitorización estricta del crecimiento y desarrollo.*
- *Infección pulmonar (como tuberculosis) e infección por herpes.*

#### **EFFECTOS ADVERSOS**

- *Reacciones alérgicas, alteraciones digestivas y aumento de la incidencia de infecciones.*

#### **RECOMENDACIONES**

- *Aténgase a la dosis prescrita y siga estrictamente las instrucciones sobre la frecuencia y duración del tratamiento.*
- *Enjuáguese la boca tras tomar el medicamento.*
- *Este medicamento es un corticoide y tiene cierto efecto inmunosupresor por lo que aumenta la probabilidad de aparición de infecciones.*