

---

## CAPTOPRILO solución 1 mg/ml

### COMPOSICIÓN

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Captoprilo.....                   | 100 mg |
| Agua estéril para irrigación..... | 30 ml  |
| Ascorbato sódico.....             | 500 mg |
| Jarabe simple c.s.p.....          | 100 ml |

#### Conservación

Refrigerado, protegido de la luz y el aire.

#### Caducidad

45 días

#### Administración

Oral

### MODUS OPERANDI

- 1.- Pesar el polvo, teniendo en cuenta la riqueza del mismo.
- 2.- Verter el polvo sobre el vaso de precipitado, previamente aforado.
- 3 - Añadir el agua estéril y agitar hasta disolución.
- 4.- Añadir el ascorbato sódico y agitar hasta disolución.
- 5.- Completar hasta 100 ml con jarabe simple.
- 6 - Agitar hasta completa homogeneización.
- 7.- Envasar en jeringas topacio para administración oral.

### INDICACIONES

Hipertensión media y severa, insuficiencia cardíaca congestiva y otros

### OBSERVACIONES

El captoprilo en solución es muy inestable. Tanto la adición de ascorbato como el envasado en jeringas tienen por objeto evitar la oxidación y prolongar la estabilidad. El pH también es importante no debe estar por encima de 4.

El olor azufrado no indica degradación.

En el etiquetado deberá figurar: El lote, la caducidad , protección de la luz , conservación en frigorífico y que contiene sacarosa (0,6 g/ml).

La estabilidad que indicamos, está basada en la bibliografía encontrada para formulaciones similares preparadas a partir de la especialidad farmacéutica..

### BIBLIOGRAFÍA

- 1.- Drug-dex evaluations. Micromedex® Healthcare Series, Vol 123, 2005.
- 2.- Nahata MC, Morosco RS, Hipple. Stability of captopril in liquid containing ascorbic acid or sodium ascorbate. Am J Hosp. Pharm 51: 1707-8. 1994.
- 3.- Martindale. The complete Drug Reference, 32 ed. Pharmaceuticals Press. Massachusetts. Pág 836.1999.

---

Membrete  
o sello de la Farmacia

## **CAPTOPRILO solución 1 mg/ml INFORMACIÓN AL PACIENTE**

### **INDICACIONES**

- *Hipertensión arterial media y severa, insuficiencia cardiaca congestiva y nefropatía en diabetes tipo I.*

### **CONSERVACIÓN**

- *Refrigerado y protegido de la luz y el aire.*

### **MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS QUE NO DEBE TOMAR**

- *Indique a su médico si está en tratamiento con litio, diuréticos (furosemida, clortalidona o ahorradores de potasio), analgésicos o antiinflamatorios (aspirina, ibuprofeno o indometacina).*
- *Los alimentos interfieren en la absorción del captoprilo. Es conveniente la restricción de sal en la terapia con captoprilo solo.*

### **¿CÓMO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?**

- *La administración se hará 1 hora antes o 2 horas después de las comidas.*
- *Si olvida tomar una dosis tómela tan pronto como se acuerde, salvo que quede poco tiempo para la próxima administración, es ese caso ignore la dosis olvidada.*

### **¿CUÁNDO NO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?**

- *Cuando haya sufrido previamente una reacción alérgica a captoprilo u otros medicamentos hipotensores.*
- *Cuando esté o sospeche que puede estar embarazada.*

### **PRECAUCIONES**

- *Este medicamento está contraindicado en embarazadas (especialmente durante el 2º y 3er trimestre). Sin embargo es compatible con la lactancia materna.*
- *En caso de angioedema, deterioro de la función renal, insuficiencia cardiaca, hepática o renal.*
- *Este medicamento contiene sacarosa como excipiente, por lo que deberá ser tenido en cuenta en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, problemas de absorción de glucosa, deficiencia de sacarasa-isomaltasa y pacientes diabéticos.*

### **EFECTOS ADVERSOS**

- *Son en general frecuentes aunque leves y transitorios. El efecto adverso más característico es la aparición de tos seca persistente. También puede producir mareos, somnolencia, cefalea, alteraciones del gusto, erupciones cutáneas o picor.*
- *Los niños menores de 7 años, especialmente neonatos, pueden tener una susceptibilidad incrementada a los efectos adversos hemodinámicos.*

### **RECOMENDACIONES**

- *Para evitar descensos bruscos de tensión el tratamiento se iniciará con dosis bajas y preferiblemente por la noche.*
- *Evite la realización de ejercicio físico intenso.*

*- No utilice sustitutos de sal de mesa sin conocimiento previo de su médico.*