

---

## CICLOFOSFAMIDA solución

### COMPOSICIÓN

Ciclofosfamida (Genoxal ® vial) c.s.p  
Elixir aromático (Ver cita 2).....250 ml

#### Conservación

Refrigerado, fotosensible

#### Caducidad

14 días

#### Administración

Oral

### MODUS OPERANDI

- 1.- Disolver el vial si es liofilizado y tomar la cantidad necesaria para dar de forma adecuada la dosis prescrita.
- 2.- Añadir el elixir.
- 3.- Envasar en frascos de cristal topacio

### INDICACIONES

Antineoplásico alquilante para linfoma maligno, mieloma múltiple.

### OBSERVACIONES

El principio activo ciclofosfamida hasta la fecha, no se encuentra en el mercado, por ello hay que preparar esta fórmula a partir de la especialidad: Genoxal ® vial. El vial no se debe disolver con agua bacteriostática conteniendo alcohol bencílico como preservativo, ya que puede llegar a descomponerse. Para su preparación hay que seguir " las Normas y Procedimientos para el manejo de citostáticos". Como elixir se puede usar cualquiera de los que recoge la cita 2.

### BIBLIOGRAFÍA

- 1.- San Miguel MT, Vila N, Najera MD, Alonso JM. Manual de Formulaciones pediátricas orales. Hospital Arrixaca. Murcia. 1997.
- 2.- Remington's Pharmaceutical Sciences, RPS XIV, 14 ed. Pág. 1341, 1970.
- 3.- Atienza Fernández M, Lluch Colomer A, Martínez Atienza J y Santos Rubio MD. Formulación en Farmacia Pediátrica. 1ª Ed: Litografía Sevillana. 2001.
- 4.- Atienza Fernández M, y Martínez Atienza J. Formulación en Farmacia Pediátrica. 2ªEd: Litografía Sevillana. 2002.
- 5.- Drugdex Evaluations. Micromedex®. The Healthcare Series, Vol 123, 2005.

---

Membrete  
o sello de la Farmacia

## **CICLOFOSFAMIDA solución**

### **INFORMACIÓN AL PACIENTE**

#### **INDICACIONES**

- Antineoplásico alquilante para linfoma maligno, mieloma múltiple y otras neoplasias.
- Inmunosupresor en trasplante de órganos y de médula ósea y en enfermedades autoinmunes.

#### **CONSERVACIÓN**

- En frigorífico y protegido de la luz directa.

#### **MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS QUE NO DEBE TOMAR**

- Indique a su médico si está en tratamiento con alopurinol, pentostatina, fenobarbital, tamoxifeno, esteroides, quinolonas o indometacina. Indique también a su médico si va a recibir alguna vacuna.
- No interfiere con los alimentos.

#### **¿CÓMO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?**

- Debe tomarse con alimentos para disminuir las molestias digestivas. Beba abundante líquido durante el tratamiento.
- Si olvida tomar una dosis tómela tan pronto como se acuerde, salvo que quede poco tiempo para la próxima administración, es ese caso ignore la dosis olvidada.

#### **¿CUÁNDO NO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?**

- Cuando haya sufrido previamente una reacción alérgica a ciclofosfamida.
- Cuando esté o sospeche que puede estar embarazada y durante la lactancia.

#### **PRECAUCIONES**

- Se recomienda el uso de anticonceptivos en hombres o mujeres de edad fértil hasta 6 meses después del final del tratamiento. Los efectos adversos sobre el feto pueden proceder de la madre o del padre. Este medicamento también está contraindicado durante la lactancia.
- Este medicamento tiene un efecto inmunosupresor por lo que aumenta la probabilidad de adquirir una infección.

#### **EFFECTOS ADVERSOS**

- Reacciones alérgicas, alteraciones cutáneas, digestivas, urinarias (cistitis hemorrágica) o sanguíneas. También puede producir cambios de coloración en orina, piel y uñas.

#### **RECOMENDACIONES**

- Lavarse las manos y los dientes frecuentemente.
- Evitar el contacto con enfermos y personas con una infección activa.
- Evitar la práctica de deportes o actividades de riesgo que puedan producir cortes, heridas o contusiones de gravedad.
- Recuentos sanguíneos y análisis de orina periódicos.

