
DAPSONA suspensión 5 mg/ml

COMPOSICIÓN

Dapsona.....	500 mg
Agua conservans	30 ml
Acido cítrico al 25 % c.s.p. pH 4 –5	
Jarabe simple c.s.p.....	100 ml

Conservación

Refrigerado, protegido de la luz

Caducidad

3 meses

Administración

Oral

MODUS OPERANDI

- 1.- Triturar los comprimidos de Sulfona® 100 mg (Ver observaciones)
- 2.- Tamizar el polvo por tamiz de 0,25 mm de luz y 9-10 cm de diámetro.
- 3.- Colocar el polvo en el vaso de precipitado
- 4.- Añadir poco a poco el agua agitando hasta formar una pasta espesa, continuar añadiendo el agua sin dejar de agitar.
- 5.- Añadir un poco de jarabe y agitar.
- 6.- Añadir la solución de cítrico al 25 % hasta ph 4-5.
- 7.- Completar con jarabe simple.
- 8.- Agitar bien hasta completa homogeneización y
- 9.- Envasar seguidamente en frascos topacio de plástico.

INDICACIONES

Dermatitis herpetiforme. Tratamiento de lepra. Tratamiento de neumonía por Pneumocystis carinii.

OBSERVACIONES

Hasta la fecha, la dapsona como materia prima, no es posible adquirirla en el mercado, por ello, nos vemos obligados a efectuar esta fórmula a partir de la especialidad: Sulfona® comprimidos de 100 mg.

En la etiqueta deberá figurar el lote, caducidad, conservación en frigorífico, protección de la luz y que contiene sacarosa (0,6 g/ml).

Puede conservarse también a temperatura ambiente, por encima de 25 °C, de este modo, en algunas ocasiones la suspensión toma un color ligeramente amarillento, sin embargo no cambia de olor ni de sabor.

BIBLIOGRAFÍA

- 1.- Drugdex drug evaluations. Micromedex® Healthcare Series, Vol.123 , 2005.

Membrete
o sello de la Farmacia

DAPSONA suspensión oral

INFORMACIÓN AL PACIENTE

INDICACIONES

- *Tratamiento de la lepra en todas sus formas. Profilaxis y tratamiento de neumonía por *Pneumocystis carinii* y toxoplasmosis en pacientes inmunodeprimidos.*

CONSERVACIÓN

- *Refrigerado y protegido de la luz.*

MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS QUE NO DEBE TOMAR

- *Puede interactuar con cimetidina, clofazimina, didanosina, probenecid, rifampicina y trimetoprim.*
- *No interfiere con los alimentos.*

¿CÓMO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

- *Agite bien el medicamento antes de administrarlo.*
- *Tome el medicamento después de las principales comidas para disminuir la molestias digestivas.*
- *Si olvida tomar una dosis tómela tan pronto como se acuerde, salvo que quede poco tiempo para la próxima administración, es ese caso ignore la dosis olvidada.*

¿CUÁNDO NO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

- *Cuando haya sufrido previamente una reacción alérgica a dapsona.*

PRECAUCIONES

- *Anemia, enfermedad hepática o renal.*
- *En madres lactantes se recomienda la suspensión de la lactancia materna o evitar la administración del medicamento. Su uso durante el embarazo sólo se acepta en caso de ausencia de alternativas terapéuticas más seguras.*
- *Este medicamento contiene sacarosa como excipiente, por lo que deberá ser tenido en cuenta en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, problemas de absorción de glucosa, deficiencia de sacarasa-isomaltasa y pacientes diabéticos.*

EFFECTOS ADVERSOS

- *Anemia hemolítica, dolor de espalda, piernas o estómago, cansancio, fiebre y palidez de piel.*
- *Reacciones de hipersensibilidad: dermatitis y erupciones cutáneas.*

RECOMENDACIONES

- *Controles sanguíneos periódicos.*