
DEXAMETASONA jarabe 1 mg/ml

COMPOSICIÓN

Dexametasona.....	100	mg
Jarabe simple c.s.p.....	100	ml

Conservación

Refrigerado, protegido de la luz

Caducidad

3 meses

Administración

Oral

MODUS OPERANDI

- 1.- Pesar la cantidad de polvo correspondiente teniendo en cuenta la riqueza del mismo.
- 2.- Colocar el polvo en el vaso de precipitado.
- 3.- Añadir una pequeña cantidad de jarabe como para formar una pasta espesa y agitar bien; continuar añadiendo jarabe sin dejar de agitar, hasta formar una pasta fluida.
- 4.- Completar con jarabe simple hasta un volumen final de 100 ml. Agitar bien.
- 5.- Envasar en frascos topacio. Etiquetar.

INDICACIONES

Hormona corticosuprarrenal con acciones antiinflamatoria e inmunosupresora.

OBSERVACIONES

En la etiqueta deberá figurar el lote, caducidad, conservación en frigorífico, protección de la luz y que contiene sacarosa (0,8 g/ml).

El seguimiento de la estabilidad de la fórmula, ha sido llevado a cabo durante 3 meses, por la Lcda. Amparo Gómez Gallo, bajo la supervisión de las Dras: M^a A. Ruiz Martínez y V. Gallardo Lara., Profesoras titulares del Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Facultad de Farmacia de Granada.

BIBLIOGRAFÍA

- 1.- Martindale. The complete Drug Reference, 32 ed. Pharmaceuticals Press. Massachusetts. 1037; 1999.
- 2.- Atienza Fernández M, Lluch Colomer A, Martínez Atienza J y Santos Rubio MD. Formulación en Farmacia Pediátrica. 1^a Ed: Litografía Sevillana. 2001.
- 3.- Atienza Fernández M, y Martínez Atienza J. Formulación en Farmacia Pediátrica. 2^aEd: Litografía Sevillana. 2002.
- 4.- Drugdex drug evaluations. Micromedex® Healthcare Series, Vol.123 , 2005

Membrete
o sello de la Farmacia

DEXAMETASONA jarabe 1 mg/ml

INFORMACIÓN AL PACIENTE

INDICACIONES

- *Corticoesteroide de acción prolongada con efectos antiinflamatorios e inmunosupresores.*

CONSERVACIÓN

- *Refrigerado y protegido de la luz.*

MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS QUE NO DEBE TOMAR

- *Indique a su médico si está en tratamiento con anticoagulantes, diuréticos, efedrina, insulina, fenobarbital, fenitoína o suplementos de potasio.*
- *No interfiere con los alimentos.*

¿CÓMO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

- *Se recomienda tomar la dexametasona con alimentos para disminuir las molestias digestivas.*
- *Si olvida tomar una dosis tómela tan pronto como se acuerde (no administrar en ningún caso por la noche, esperar hasta la mañana siguiente), si queda poco tiempo para la próxima administración tome las dos dosis a la vez; después siga con el horario normal.*

¿CUÁNDO NO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

- *Cuando haya sufrido previamente una reacción alérgica a dexametasona o cuando tenga una infección por hongos.*

PRECAUCIONES

- *Este medicamento es inmunosupresor por lo que aumenta la probabilidad de aparición de infecciones (candidiasis orofaríngea).*
- *Su uso durante el embarazo sólo se acepta en caso de ausencia de alternativas terapéuticas más seguras, aunque se ha utilizado ampliamente en casos indispensables. En madres lactantes se recomienda utilizar corticoides con mínima excrección en leche materna (prednisona).*
- *En niños existe riesgo de retraso del crecimiento con el uso crónico.*
- *Este medicamento contiene sacarosa como excipiente, por lo que deberá ser tenido en cuenta en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, problemas de absorción de glucosa, deficiencia de sacarasa-isomaltasa y pacientes diabéticos.*

EFECTOS ADVERSOS

- *Las reacciones adversas son más frecuentes con dosis altas y en tratamientos prolongados. Puede aparecer fragilidad ósea, aumento de glucosa en sangre, retraso en la cicatrización de las heridas y cierta propensión a infecciones.*

RECOMENDACIONES

- *No interrumpa nunca de forma brusca un tratamiento prolongado.*
- *En niños y adolescentes con tratamientos crónicos se realizará un control periódico del crecimiento.*