
FLECAINIDA suspensión 5 mg/ml

COMPOSICIÓN

Flecainida.....	500 mg
Metilcelulosa al 1 %.....	50 ml
Jarabe simple c.s.p.....	100 ml

Conservación

Refrigerado, Protegido luz

Caducidad

1 mes

Administración

Oral

MODUS OPERANDI

- 1.- Triturar en el mortero los comprimidos de Apocard®.
- 2.- Tamizar el polvo.
- 3.- Verter el polvo sobre el vaso de precipitado.
- 4.- Añadir la metilcelulosa poco a poco hasta formar una pasta espesa, seguir añadiendo hasta consistencia líquida.
- 5.- Incorporar el jarabe.
- 6.- Colocar en el agitador a 2000 r.p.m. hasta total homogeneización.
- 7.- Envasar seguidamente en frascos topacio, llenándolos hasta poco más de la mitad.

INDICACIONES

Antiarrítmico de tipo Ic, arritmias ventriculares y supraventriculares.

OBSERVACIONES

Hasta la fecha, la flecainida como materia prima, no es posible adquirirla en el mercado, por ello, nos vemos obligados a efectuar esta fórmula a partir de la especialidad:

Apocard® comp 100 mg.

Otros autores, le dan 45 y 60 días de estabilidad, empleando fórmulas similares.

En el etiquetado deberá figurar: "Agitar antes de usar", lote, caducidad, conservación en frigorífico, protección de la luz y que contiene sacarosa (0,4 g/ml).

BIBLIOGRAFÍA

- 1.- Allen LV, Erickson MA. Stability of baclofen, captopril, diltiazem hydrochloride, dipyridamol and flecainida acetate in extemporaneously compounded oral liquids. AmJ Health Sist. Phar 53: 2179-84. 1996.
- 2.- Int J Pharm Comp, vol I, nº 2, pág 103, 1997
- 3.- Atienza Fernández M, Lluch Colomer A, Martínez Atienza J y Santos Rubio MD. Formulación en Farmacia Pediátrica. 1ª Ed: Litografía Sevillana. 2001.
- 4.- Atienza Fernández M, y Martínez Atienza J. Formulación en Farmacia Pediátrica. 2ªEd: Litografía Sevillana. 2002.
- 5.- Drugdex drug evaluations. Micromedex® Healthcare Series, Vol.123, 2005.

Membrete
o sello de la Farmacia

FLECAINIDA suspensión 5 mg/ml **INFORMACIÓN AL PACIENTE**

INDICACIONES

- *Antiarrítmico del grupo Ic utilizado en el tratamiento de arritmias ventriculares y supraventriculares.*

CONSERVACIÓN

- *Refrigerado y protegido de la luz.*

MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS QUE NO DEBE TOMAR

- *Indique a su médico si está en tratamiento con digoxina, betabloqueantes o verapamilo.*

¿CÓMO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

- *Agite bien el medicamento antes de administrarlo.*
- *Puede tomarlo con alimento, leche o antiácidos para disminuir las molestias digestivas.*
- *Si toma el medicamento 2 veces al día y olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como se acuerde, salvo que hayan pasado más de 6 horas, es ese caso ignore la dosis olvidada y siga con el horario habitual.*

¿CUÁNDO NO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

- *Cuando haya sufrido previamente una reacción alérgica a flecainida.*

PRECAUCIONES

- *Su uso durante el embarazo sólo se acepta en caso de ausencia de alternativas terapéuticas más seguras. Su uso se considera compatible con la lactancia materna.*
- *Insuficiencia cardíaca, renal o hepática.*
- *Este medicamento contiene sacarosa como excipiente, por lo que deberá ser tenido en cuenta en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, problemas de absorción de glucosa, deficiencia de sacarasa-isomaltasa y pacientes diabéticos.*

EFFECTOS ADVERSOS

- *Son, en general, infrecuentes aunque moderadamente importantes.*
- *Arritmias, mareos, desorientación, dificultad respiratoria, cefalea o visión borrosa.*

RECOMENDACIONES

- *El tratamiento deberá interrumpirse siempre de forma gradual, disminuyendo poco a poco las dosis. No interrumpir de forma brusca sin consultar con su médico.*