
HIDRATO DE CLORAL jarabe 100 mg/ml

COMPOSICIÓN

Hidrato de cloral.....	10 g
Agua purificada.....	5 ml
Jarabe simple c.s.p.....	100 ml
Esencia de fresa c.s. (Ver observaciones)	

MODUS OPERANDI

Para la elaboración de esta fórmula es necesario guantes y mascarilla.

- 1- Se pesa el hidrato de cloral y se disuelve en el agua purificada.
- 2- En un vaso de precipitado se vierte una parte del jarabe simple, se le añade la esencia de fresa (Ver observaciones) y se homogeneiza.
- 3- Se añade la solución de hidrato de cloral y se agita.
- 4.- Se enrasa con jarabe simple hasta el volumen total.
- 5.- Se envasa en frascos topacio con cierre hermético.

INDICACIONES Y POSOLOGÍA

Sedante e hipnótico en niños que van a ser sometidos a pruebas diagnósticas.

Posología en neonatos: Sedante previo a la prueba : 25 mg/kg/dosis.

Posología lactantes y niños:

- Sedante previo a la prueba: 25-50 mg/kg/dosis, 30-60 minutos antes de la prueba. Puede repetirse a los 30 minutos hasta una dosis total máxima de 100 mg/kg o 1 g total lactantes y 2 g para niños.
- Hipnótico: 50 mg/kg/dosis, siendo la dosis máxima 2 g/día

OBSERVACIONES

De los autores: No añadimos esencia, dado que las esencias son generalmente compuestos artificiales cuya composición es secreto de mercado y de más de 25 componentes, no consideramos adecuada su adición a ninguno de los preparados para pediatría.

Algunos estudios de estabilidad, concluyen para esta preparación mayor tiempo de conservación que el señalado en este procedimiento.

En la etiqueta deberá figurar el lote, caducidad, conservación, protección de la luz y que contiene sacarosa (0,8 g/ml aprox.).

REACCIONES ADVERSAS, PRECAUCIONES, CONTRAINDICACIONES E INTERACCIONES así como los COMENTARIOS Y OBSERVACIONES que incluye el Formulario Nacional en esta parte, se citan en el prospecto de INFORMACIÓN AL PACIENTE, por lo que los omitimos aquí, para evitar la repetición de los mismos dentro del mismo procedimiento. (El prospecto para el paciente de esta fórmula, no es copia literal del Formulario Nacional sino que sigue la línea marcada por los autores para el resto de las fórmulas que componen esta 3ª edición).

BIBLIOGRAFÍA

- 1.- Formulario Nacional. 1ª Edición. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid.2003
-

Conservación

T^a < 30°C, protegido luz y aire

Caducidad

2 semanas

Administración

Oral

Membrete
o sello de la Farmacia

HIDRATO DE CLORAL jarabe 100 mg/ml

INFORMACIÓN AL PACIENTE

INDICACIONES

- *Ansiolítico e hipnótico utilizado en la sedación para pruebas diagnósticas no invasivas en pediatría.*

CONSERVACIÓN

- *Refrigerado y protegido de la luz.*

MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS QUE NO DEBE TOMAR

- *Indique a su médico si está en tratamiento con anticoagulantes.*
- *Evite tomar otros fármacos que puedan producir somnolencia, como los medicamentos para el resfriado o la alergia y los relajantes musculares.*

¿CÓMO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

- *Puede mezclarse con medio vaso de agua o zumo de fruta para su administración.*
- *Si olvida tomar una dosis tómela tan pronto como se acuerde, salvo que quede poco tiempo para la próxima administración, es ese caso ignore la dosis olvidada.*

¿CUÁNDO NO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

- *Cuando haya sufrido previamente una reacción alérgica a hidrato de cloral, tenga gastritis, úlcera gástrica o una enfermedad renal, hepática o cardíaca severa.*

PRECAUCIONES

- *Consulte a su médico en caso de embarazo o lactancia.*
- *Puede provocar dependencia. No administre más dosis de la prescrita.*
- *Tomar con mucha precaución en caso de enfermedad cardíaca.*
- *Este medicamento, por contener sacarosa (excipiente), deberá ser tenido en cuenta en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, problemas de absorción de glucosa, deficiencia de sacarasa-isomaltasa y pacientes diabéticos.*

EFFECTOS ADVERSOS

- *Puede provocar náuseas, vómitos, dolor estomacal, diarrea, cefalea, alucinaciones o confusión.*

RECOMENDACIONES

- *No interrumpa bruscamente el tratamiento sin consultar a su médico.*