

---

## IPECACUANA jarabe

### COMPOSICIÓN

Extracto fluido de ipecacuana.....	7	ml
Ácido clorhídrico 0,1 N.....	2,5	ml
Jarabe simple.....	100	ml

#### Conservación

T<sup>a</sup> < 25 °C, protegido de la luz

#### Caducidad

3 meses

#### Administración

Oral

### MODUS OPERANDI

- 1.- Medir el extracto y el HCl
- 2.- Añadir el jarabe y homogeneizar.
- 3.- Mantener en agitación durante 5 minutos.
- 4.- Envasar en frasco topacio de volumen no superior a 30 ml.

### INDICACIONES Y POSOLOGÍA

Como inductor del vómito deben usarse las siguientes dosis:

Niños de 6-12 meses: 5-10 ml de jarabe

Niños de 1-12 años: 15 ml de jarabe

Adultos y niños mayores de 12 años: 15-30 ml de jarabe.

El vómito se induce tomando la cantidad indicada de jarabe y bebiendo a continuación una gran cantidad de líquidos (aproximadamente 1 litro en adultos y 15 ml/kg en niños).

Estos líquidos pueden ser agua o zumo de frutas pero no leche. En niños pequeños se puede invertir el orden, primero el líquido y luego el jarabe.

Una vez administrado, el paciente permanecerá en posición erguida, nunca tumbado. Si es niño, se le mantendrá en decúbito prono.

Solo en el caso de no producirse el vómito se puede repetir la dosis a los 20-30 minutos y solo una vez. Las dosis deben recuperarse mediante lavado de estómago, si tras la segunda dosis el vómito no se produce.

### REACCIONES ADVERSAS, PRECAUCIONES, CONTRAINDICACIONES E INTERACCIONES

así como los **COMENTARIOS Y OBSERVACIONES** que incluye el Formulario Nacional en esta parte, se citan en el prospecto de INFORMACIÓN AL PACIENTE, por lo que omitimos aquí estos apartados, para evitar la repetición de los mismos dentro del mismo procedimiento. (El prospecto para el paciente de esta fórmula, no es copia literal del Formulario Nacional sino que sigue la línea marcada por los autores para el resto de las fórmulas que componen esta 3<sup>a</sup> edición).

### BIBLIOGRAFÍA

- 1- Formulario Nacional. L<sup>a</sup> Edición. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid.
-

Membrete  
o sello de la Farmacia

## **IPECACUANA jarabe**

### **INFORMACIÓN AL PACIENTE**

#### **INDICACIONES**

- Utilizado para provocar el vómito en intoxicaciones producidas por vía oral, siempre que no esté contraindicado el vómito.

#### **CONSERVACIÓN**

- Refrigerado y protegido de la luz.

#### **MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS QUE NO DEBE TOMAR**

- Indique a su médico si está tomando otros medicamentos.
- No tome nunca el jarabe de ipecacuana con leche o bebidas carbonatadas.

#### **¿CÓMO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?**

- Se debe tomar al menos un vaso de líquido (agua o zumos) después del jarabe de ipecacuana. Los niños deben tomar un vaso de agua antes de administrar el jarabe.
- Si no se produce el vómito 20 o 30 minutos después de tomar el jarabe administrar otra dosis.

#### **¿CUÁNDO NO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?**

- Cuando haya sufrido previamente una reacción alérgica a la ipecacuana.
- Cuando esté inconsciente.

#### **PRECAUCIONES**

- Embarazo o lactancia.
- Enfermedad cardíaca.
- No administrar nunca la tintura o el extracto fluido concentrado.
- No administrar en caso de intoxicación por estricnina, ácidos, bases, gasolina o productos de limpieza.

#### **EFFECTOS ADVERSOS**

- Pueden aparecer vómitos o diarreas intensas y otras alteraciones digestivas, somnolencia, debilidad muscular o palpitaciones.

#### **RECOMENDACIONES**

- Utilizar únicamente por prescripción facultativa.