
KETAMINA solución 10 mg/ml

COMPOSICIÓN

Ketamina.....500 mg
Jarabe simple c.s.p.....50 ml

Conservación

Refrigerado, protegido de la luz

Caducidad

1 mes

Administración

Oral

MODUS OPERANDI

- 1.- Tomar la ketamina, a partir del vial de Ketolar® (Ver observaciones).
- 2.- Añadir el jarabe simple.
- 3.- Envasar y etiquetar.

INDICACIONES

Fibromialgias.

OBSERVACIONES

Hasta la fecha, la ketamina como materia prima, no es posible adquirirla en el mercado, por ello, nos vemos obligados a efectuar esta fórmula a partir de la especialidad:

Ketolar® 50 mg/ml, vial de 10 ml.

Se prepara habitualmente para la unidad de quemados y tiene como objetivo anestésico y provocar amnesia, para evitar que recuerden el momento de la cura.

La dosificación habitual es de 10 mg/kg.

En la etiqueta deberá figurar el lote, caducidad, conservación en frigorífico, protección de la luz y que contiene sacarosa (0,8 g/ml).

BIBLIOGRAFÍA

- 1.- Drugdex drug evaluations. Micromedex® Healthcare Series, Vol.123, 2005.

Membrete
o sello de la Farmacia

KETAMINA solución 10 mg/ml

INFORMACIÓN AL PACIENTE

INDICACIONES

- *Fibromialgias. Anestésico de rápido comienzo de acción que produce una anestesia disociada caracterizada por amnesia y fuerte analgesia..*

CONSERVACIÓN

- *Refrigerado, protegido de la luz.*

MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS QUE NO DEBE TOMAR

- *No administrar conjuntamente con teofilina.*
- *La administración concomitante de ansiolíticos o barbitúricos prolonga el tiempo de recuperación. También puede interaccionar con tramadol o con bloqueantes neuromusculares (atracurio, pancuronio, tubocurarina).*
- *Se aconseja no tomar nada por vía oral durante varias horas antes.*

¿CÓMO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

- *La dosis adecuada le será indicada por personal especializado.*

¿CUÁNDO NO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

- *Cuando haya sufrido previamente una reacción alérgica a ketamina.*
- *Cuando un aumento excesivo de la presión arterial suponga un riesgo elevado (insuficiencia, cardíaca, trauma cerebral, aneurisma o infarto reciente).*

PRECAUCIONES

- *Edad inferior a tres meses, enfermedad psiquiátrica, glaucoma, hipertiroidismo o infección pulmonar.*
- *Su uso durante el embarazo solo se acepta en caso de ausencia de alternativas terapéuticas más seguras (posible depresión respiratoria en el neonato si se administra muy próxima al parto a dosis altas). Se ignora si es excretada con la leche materna; se recomienda suspender la lactancia materna y reanudarla 12 h después de la administración de ketamina.*
- *Este medicamento, por contener sacarosa (excipiente), deberá ser tenido en cuenta en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, problemas de absorción de glucosa, deficiencia de sacarasa-isomaltasa y pacientes diabéticos.*

EFFECTOS ADVERSOS

- *Principalmente a nivel del sistema nervioso central. Reacciones psicológicas: somnolencia, confusión, delirio, excitación o alteraciones del comportamiento. Estas reacciones tienen una menor incidencia en niños menores de 15 años*
- *Hipertensión, taquicardia o taquipnea.*

RECOMENDACIONES

- *Durante la recuperación debe minimizarse la estimulación verbal, visual y táctil del paciente; es recomendable que esté acompañado por un adulto durante la misma.*