
MIDAZOLAM jarabe 2,5 mg/ml

COMPOSICIÓN

Midazolam150 mg
Jarabe simple c.s.p.....60 ml

Conservación

Refrigerado, protegido luz

Caducidad

1 mes

Administración

Oral

MODUS OPERANDI

- 1.- Verter el contenido de las ampollas de Dormicum® (ver observaciones), dentro de un vaso de precipitado.
- 2.- Completar hasta 60 ml con jarabe simple.
- 3.- Agitar bien con un varilla.
- 4.- Envasar en jeringas topacio para administración oral.
- 5.- Etiquetar.

INDICACIONES

Inducción a la anestesia, hipnótico antes de operaciones de cirugía corta.

OBSERVACIONES

Hasta la fecha, el midazolam como materia prima, no es posible adquirirlo en el mercado, por ello, nos vemos obligados a efectuar esta fórmula a partir de la especialidad: Dormicum® ampollas 50 mg, de 10 ml u otra especialidad disponible. La conservación varía según los trabajos revisados. Algunos autores citan hasta 56 días. En la etiqueta deberá figurar el lote, caducidad, conservación en frigorífico, protección de la luz y que contiene sacarosa (0,4 g/ml).

BIBLIOGRAFÍA

- 1.- Manual de formulaciones pediátricas orales, Hospital Arrixaca, Murcia, 1997.
- 2.- Atienza Fernández M, Lluch Colomer A, Martínez Atienza J y Santos Rubio MD. Formulación en Farmacia Pediátrica. 1ª Ed: Litografía Sevillana. 2001.
- 3.- Atienza Fernández M, y Martínez Atienza J. Formulación en Farmacia Pediátrica. 2ªEd: Litografía Sevillana. 2002.
- 4.- Drugdex drug evaluations. Micromedex® Healthcare Series, Vol.123, 2005

Membrete
o sello de la Farmacia

MIDAZOLAM jarabe 2,5 mg/ml

INFORMACIÓN AL PACIENTE

INDICACIONES

- *Ansiolítico e hipnótico utilizado en la inducción a la anestesia antes de operaciones de cirugía corta.*

CONSERVACIÓN

- *Refrigerado y protegido de la luz.*

MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS QUE NO DEBE TOMAR

- *Indique a su médico si está en tratamiento con ketoconazol, itraconazol, cimetidina, eritromicina antiarrítmicos, antihipertensivos, antirretrovirales (VIH) u otros medicamentos que puedan producir somnolencia.*
- *No tome pomelo o zumo de pomelo ni de uvas, durante el tratamiento.*

¿CÓMO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

- *Su médico le indicará la frecuencia . Debe ser administrado con el estómago vacío.*

¿CUÁNDO NO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

- *Cuando haya sufrido previamente una reacción alérgica a midazolam.*
- *En caso de glaucoma de ángulo cerrado.*

PRECAUCIONES

- *Este medicamento puede provocar amnesia anterógrada (olvido de cosas próximas) durante algunas horas. No se preocupe, es una situación normal y pasajera.*
- *Uso controvertido durante el embarazo. En madres lactantes se recomienda la suspensión de la lactancia materna o evitar la administración del medicamento.*
- *Insuficiencia respiratoria, hepática o renal.*
- *Puede provocar reacciones de fotosensibilidad.*
- *Con el uso prolongado se desarrolla dependencia.*
- *Este medicamento, por contener sacarosa (excipiente), deberá ser tenido en cuenta en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, problemas de absorción de glucosa, deficiencia de sacarasa-isomaltasa y pacientes diabéticos.*

EFECTOS ADVERSOS

- *Puede provocar problemas respiratorios, náuseas, vómitos, eritema, cefaleas o somnolencia.*
- *Las posibles reacciones adversas responden bien al flumazenilo.*

RECOMENDACIONES

- *No es recomendable una exposición prolongada al sol durante el tratamiento.*
- *No interrumpir el tratamiento de forma brusca.*