
MISOPROSTOL colutorio

COMPOSICIÓN

Misoprostol.....	0,002 g
Glicerina.....	8 ml
Jarabe simple.....	30 ml
Carboximetilcelulosa al 0,25 % c.s.p(*).....	80 ml

Conservación

Refrigerado, protegido de la luz

Caducidad

No estudiada

Administración

Colutorio

MODUS OPERANDI

- 1.- Triturar los comprimidos necesarios en el mortero.
- 2.- Tamizar el polvo, por tamiz de 0,25 mm de luz y unos 9 cm de diámetro.
- 3.- Verter el polvo en el vaso de precipitado.
- 4.- Añadirle la glicerina agitando al mismo tiempo.
- 5.- Incorporar el jarabe simple poco a poco y sin dejar de agitar.
- 6.- Completar con la solución de carboximetilcelulosa hasta 80 ml.
- 7.- Envasar y etiquetar.

INDICACIONES

Ulceraciones bucales producidas por terapia anticancerosa.

OBSERVACIONES

Hasta la fecha, el misoprostol como materia prima, no es posible adquirirlo en el mercado, por ello, nos vemos obligados a efectuar esta fórmula a partir de la especialidad: Cytotec® comp 200 µg.(0,002 g).

(*) La solución de carboximetilcelulosa al 0,25 se obtiene a partir de la solución al 1%, que se prepara con agua conservans y que mantenemos siempre en stock en el frigorífico.

BIBLIOGRAFÍA

- 1.- Int J Pharm Comp, vol IV, nº 4, pág 302, 2000.
- 2.- Martindale. The complete Drug Reference, 32 ed. Pharmaceuticals Press. Massachusetts.1999; 1419.
- 3.- Atienza Fernández M, Lluch Colomer A, Martínez Atienza J y Santos Rubio MD. Formulación en Farmacia Pediátrica. 1ª Ed: Litografía Sevillana. 2001.
- 4.- Atienza Fernández M, y Martínez Atienza J. Formulación en Farmacia Pediátrica. 2ªEd: Litografía Sevillana. 2002.
- 5.- Drugdex drug evaluations. Micromedex® Healthcare Series, Vol 123, 2005.

Membrete
o sello de la Farmacia

MISOPROSTOL colutorio

INFORMACIÓN AL PACIENTE

INDICACIONES

- *Utilizado en el tratamiento de ulceraciones bucales producidas por la terapia anticancerosa.*

CONSERVACIÓN

- *Refrigerado y protegido de la luz.*

MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS QUE NO DEBE TOMAR

- *Por su uso tópico, no interfiere, en principio, con la administración de otros medicamentos o de alimentos.*

¿CÓMO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

- *Efectuar lavados bucales o gargarismos durante 30 segundos. No tragarlo para evitar efectos secundarios (diarrea).*

¿CUÁNDO NO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

- *Cuando haya sufrido previamente una reacción alérgica a misoprostol.*
- *Durante el embarazo o la lactancia.*

PRECAUCIONES

- *Enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares.*
- *Contraindicado en embarazo y lactancia.*

EFFECTOS ADVERSOS

- *Principalmente diarrea relacionada con la dosis que aparece tras varios días de tratamiento.*

RECOMENDACIONES

- *Para minimizar la aparición de diarreas se debe evitar la administración concomitante de otros laxantes (antiácidos que contengan magnesio).*