
MISOPROSTOL - LIDOCAÍNA colutorio

COMPOSICIÓN

Misoprostol.....	0,002 g
Lidocaína.....	0,8 g
Jarabe simple.....	40 ml
Carboximetilcelulosa al 0,25 % c.s.p(*).....	80 ml

Conservación

Refrigerado, protegido de la luz

Caducidad

2 meses

Administración

Colutorio

MODUS OPERANDI

- 1.- Triturar los comprimidos necesarios en el mortero.
- 2.- Tamizar el polvo.
- 3.- Verterlo en el vaso de precipitado.
- 4.- Añadirle la lidocaína.
- 5.- Incorporar el jarabe simple poco a poco y sin dejar de agitar.
- 6.- Completar con la solución de carboximetilcelulosa hasta 80 ml.
- 7.- Envasar y etiquetar.

INDICACIONES

Ulceraciones bucales.

OBSERVACIONES

Hasta la fecha, el misoprostol como materia prima, no es posible adquirirlo en el mercado, por ello, nos vemos obligados a efectuar esta fórmula a partir de la especialidad: Cytotec® comp 200 µg.

(*) La solución de carboximetilcelulosa al 0,25 se obtiene a partir de la solución al 1%, que se prepara con agua conservans y que mantenemos siempre en stock en el frigorífico.

Puede prepararse igualmente con misoprostol al 0,001 % y lidocaína al 0,5 %.

Envasar en frascos de cristal, porque dependiendo del pH la lidocaína se absorberá más o menos al cloruro de polivinilo.

BIBLIOGRAFÍA

- 1.- Int J Pharm Comp, vol III, nº1, pág 48, 1999.
- 2.- Martindale. The complete Drug Reference, 32 ed. Pharmaceuticals Press. Massachusetts.1999;1293 y 1419.
- 3.- Int J Pharm Comp, vol IV, nº 3, pág 211, 2000.
- 4.- Atienza Fernández M, Lluch Colomer A, Martínez Atienza J y Santos Rubio MD. Formulación en Farmacia Pediátrica. 1ª Ed: Litografía Sevillana. 2001.
- 5.- Atienza Fernández M, y Martínez Atienza J. Formulación en Farmacia Pediátrica. 2ªEd: Litografía Sevillana. 2002.
- 6.- Drugdex drug evaluations. Micromedex® Healthcare Series, Vol 123, 2005.

Membrete
o sello de la Farmacia

MISOPROSTOL-LIDOCAÍNA colutorio

INFORMACIÓN AL PACIENTE

INDICACIONES

- Utilizado en el tratamiento de ulceraciones bucales.

CONSERVACIÓN

- Refrigerado y protegido de la luz.

MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS QUE NO DEBE TOMAR

- Por su uso tópico, no interfiere, en principio, con la administración de otros medicamentos o de alimentos. Indique a su médico si está en tratamiento con otros medicamentos.

¿CÓMO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

- Efectuar lavados bucales o gargarismos durante 30 segundos. Sin tragar.
- Su médico le indicará la frecuencia y la forma de administración. Las aplicaciones se harán como máximo cada 3 horas.
- Si olvida tomar una dosis tómela tan pronto como se acuerde, salvo que quede poco tiempo para la próxima administración, es ese caso ignore la dosis olvidada.

¿CUÁNDO NO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

- Cuando haya sufrido previamente una reacción alérgica a misoprostol.
- Cuando haya sufrido previamente una reacción alérgica a lidocaína u otros anestésicos locales como tetracaína, mepivacaína o prilocaína.
- Durante el embarazo o la lactancia.

PRECAUCIONES

- Enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares.
- Contraindicado en embarazo y lactancia.
- Puede provocar molestias al tragar.

EFECTOS ADVERSOS

- Principalmente diarrea relacionada con la dosis que aparece tras varios días de tratamiento.
- Poco frecuentes en la administración tópica. Puede aparecer visión doble o borrosa, confusión, mareos, inflamación de la zona de aplicación, palpitaciones o temblor.

RECOMENDACIONES

- Para minimizar la aparición de diarreas se debe evitar la administración concomitante de otros laxantes (antiácidos que contengan magnesio).
- No tomar alimentos o bebidas hasta 1 hora después de la administración ante el riesgo de aspiración o de morderse la lengua.