
OMEPRAZOL suspensión 2 mg/ml - Fórmula 2

COMPOSICIÓN

Omeprazol.....	0,2 g
Almidón de maíz.....	9,5 g
Al(OH)3.....	7,2 g
Mg(OH)2.....	3,6 g
Jarabe simple.....	40 g
Laurilsulfato sódico.....	0,4 g
Agua c.s.p.....	100 ml

Conservación

Refrigerado, protegido luz y aire

Caducidad

30 días

Administración

Oral

MODUS OPERANDI

- 1.- Pesar la cantidad correspondiente de omeprazol, teniendo en cuenta la riqueza del mismo; esta pesada puede hacerse en un vasito de precipitado, con lo que evitaremos que puedan derramarse los pellets.
- 2.- Verterlo en mortero y triturar bien los pellets.
- 3.- Añadir los componentes sólidos.
- 4.- Incorporar el jarabe simple poco a poco y sin dejar de agitar con la mano del mortero.
- 5.- Completar añadiéndole el agua poco a poco, sin dejar de agitar, hasta consistencia homogénea.
- 6.- Envasar seguidamente en frascos de cristal topacio o en jeringas de plástico ámbar.

INDICACIONES

Antiulceroso y para el tratamiento del reflujo gastroesofágico.

OBSERVACIONES

En el etiquetado deberá figurar: "Agitar antes de usar", conservar en frigorífico, proteger de la luz, además del lote y la caducidad.

Esta fórmula es una adaptación de la desarrollada por Sierra Sánchez JF (1).

El seguimiento de la estabilidad de la fórmula, ha sido llevado a cabo durante un mes, por el Dr. Jesús Sierra Sánchez, bajo la supervisión de las Dras: M^a A. Ruiz Martínez y V. Gallardo Lara., Profesoras titulares del Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Facultad de Farmacia de Granada.

BIBLIOGRAFÍA

- 1.- Sierra Sánchez JF. Formulación magistral en pediatría: Desarrollo y puesta a punto de una suspensión de omeprazol. Tesis doctoral. Universidad de Granada. Facultad de Farmacia. Granada 2004. Dirigida por las Dras: M^a A. Ruiz y V. Gallardo.
- 2.- DiGiacinto JL, Olsen KM, Bergman KL, Hoic EB. Stability of suspension formulation of lansoprazole and omeprazole stored in amber colored plastic oral syringes. The Annals of Pharmacotherapy Vol. 34, pág. 601-605. Mayo 2000.

Membrete
o sello de la Farmacia

OMEPRAZOL suspensión 2 mg/ml

INFORMACIÓN AL PACIENTE

INDICACIONES

- *Tratamiento y prevención de úlceras gástricas y duodenales y de la esofagitis por reflujo gastroesofágico.*

CONSERVACIÓN

- *Refrigerado y protegido de la luz.*

MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS QUE NO DEBE TOMAR

- *Indique a su médico si está en tratamiento con diazepam, fenitoína, anticoagulantes, hierro, ampicilina o ketoconazol.*

¿CÓMO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

- *Agite bien el medicamento antes de administrarlo.*
- *Administrar preferentemente por las mañanas antes del desayuno; en cualquier caso tomar una hora antes de las comidas.*
- *Si olvida tomar una dosis tómela tan pronto como se acuerde, salvo que quede poco tiempo para la próxima administración, es ese caso ignore la dosis olvidada.*

¿CUÁNDO NO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

- *Cuando haya sufrido previamente una reacción alérgica a omeprazol.*

PRECAUCIONES

- *Insuficiencia hepática o historial de enfermedad hepática.*
- *En madres lactantes se recomienda la suspensión de la lactancia materna o evitar la administración del medicamento. Su uso durante el embarazo sólo se acepta en caso de ausencia de alternativas terapéuticas más seguras.*

EFFECTOS ADVERSOS

- *Es bien tolerado y las reacciones adversas son en general leves y reversibles.*
- *Puede provocar cefaleas o alteraciones gastrointestinales: diarreas, estreñimiento, dolor abdominal, náuseas /vómitos y flatulencia.*

RECOMENDACIONES

- *No mezclar para su administración con alimentos ácidos como zumos, yogourt o leche ácida.*