
PERMETRINA loción O/W al 5 %

COMPOSICIÓN

Permetrina.....	5 g
Base loción O/W L-200.....	25 g
Propilenglicol.....	15 g
Agua c.s.p.....	100 ml

Conservación

Temperatura ambiente

Caducidad

15 días

Administración

Tópica

MODUS OPERANDI

- 1.- Poner a fundir al baño de maría la base L-200 a 70°C.
- 2.- Calentar el agua a la misma temperatura y mezclar poco a poco con la base L-200.
- 3.- Triturar en el mortero la permetrina hasta polvo.
- 4.- Añadir el propilenglicol y mezclar hasta formar una pasta homogénea.

INDICACIONES

Sarna resistente a tratamiento convencional (Lindano)

OBSERVACIONES

* La BASE LOCION O/W L-200, es una base emulgente no iónica para la elaboración de emulsiones fluídas (leches, lociones) del tipo O/W.

BIBLIOGRAFÍA

- 1.- Atienza Fernández M, y Martínez Atienza J. Formulación en Farmacia Pediátrica. 2ªEd: Litografía Sevillana. 2002.
- 2.- Drugdex drug evaluations. Micromedex® Healthcare Series, Vol.123, 2005.

Membrete
o sello de la Farmacia

PERMETRINA loción al 5%

INFORMACIÓN AL PACIENTE

INDICACIONES

- *Tratamiento de blefaritis (inflamación de los párpados) por ácaros sarna y piojos.*

CONSERVACIÓN

- *A temperatura ambiente.*

MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS QUE NO DEBE TOMAR

- *Indique a su médico si está en tratamiento con otros medicamentos.*

¿CÓMO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

- *Esta pomada se administra exclusivamente vía tópica (uso externo).*
- *Aplicar mediante masaje cuidadoso y meticuloso, dejar actuar durante un tiempo (se le darán instrucciones), y aclarar con abundante agua y jabón.*

¿CUÁNDO NO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

- *Cuando haya sufrido previamente una reacción alérgica a la permetrina o a los crisantemos.*

PRECAUCIONES

- *Si la pomada entra en contacto con los ojos proceder al inmediato lavado de los mismos con abundante agua.*
- *No aplicar sobre heridas ni mucosas, ni en casos de irritación persistente de la zona.*
- *En madres lactantes se debe considerar la suspensión de la lactancia materna o de la administración del medicamento. Su uso durante el embarazo sólo se acepta en caso de ausencia de alternativas terapéuticas más seguras.*

EFFECTOS ADVERSOS

- *Picor, irritación o quemazón.*
- *Eritema, entumecimiento y hormigueo.*

RECOMENDACIONES

- *Si el prurito y/o la irritación persisten durante más de 2 semanas consulte a su médico.*