

---

## RANITIDINA solución 5 mg/ml

### COMPOSICIÓN

Ranitidina.....	400 mg
Agua conservans.....	40 ml
Jarabe simple.....	40 ml

#### Conservación

Refrigerado, protegido luz

#### Caducidad

1 mes

#### Administración

Oral

### MODUS OPERANDI

- 1.- Pesar el polvo teniendo en cuenta la riqueza del mismo y colocarlo en un vaso de precipitado.
- 2.- Añadir el agua y disolver la ranitidina.
- 3.- Añadir poco a poco el jarabe simple, agitando al mismo tiempo.
- 4.- Agitar y envasar en jeringas topacio de administración oral de 10 ml.

### INDICACIONES

Profilaxis de úlcera de estrés, antisecretor gástrico.

### OBSERVACIONES

La estabilidad que indicamos, está basada en la bibliografía encontrada para formulaciones similares elaboradas a partir de la especialidad.

En la etiqueta deberá figurar el lote, caducidad, conservación en frigorífico, protección de la luz y que contiene sacarosa ( 0,4 g/ml).

### BIBLIOGRAFÍA

- 1.- Am J Hosp Pharm, 47, pág 1574-9, 1580-4, y 2043-8,1990.
- 2.- Atienza Fernández M, Lluch Colomer A, Martínez Atienza J y Santos Rubio MD. Formulación en Farmacia Pediátrica. 1ª Ed: Litografía Sevillana. 2001.
- 3.- Atienza Fernández M, y Martínez Atienza J. Formulación en Farmacia Pediátrica. 2ªEd: Litografía Sevillana. 2002.
- 4.- Drugdex drug evaluations. Micromedex® Healthcare Series, Vol 123, 2005.

o sello de la Farmacia

## **RANITIDINA solución 5 mg/ml**

### **INFORMACIÓN AL PACIENTE**

#### **INDICACIONES**

- *Profilaxis de la úlcera de estrés y antisecretores gástricos.*

#### **CONSERVACIÓN**

- *Refrigerado y protegido de la luz.*

#### **MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS QUE NO DEBE TOMAR**

- *Indique a su médico si está en tratamiento con warfarina, triazolam, ciclosporina o vitamina B12.*

#### **¿CÓMO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?**

- *Se recomienda administrar con las comidas y a la hora de acostarse. No deben administrarse alimentos que produzcan irritación gástrica.*
- *Si olvida tomar una dosis tómela tan pronto como se acuerde, salvo que quede poco tiempo para la próxima administración, es ese caso ignore la dosis olvidada.*

#### **¿CUÁNDO NO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?**

- *Cuando haya sufrido previamente una reacción alérgica a ranitidina.*

#### **PRECAUCIONES**

- *Insuficiencia renal, insuficiencia hepática o porfiria.*
- *Su uso durante el embarazo sólo se acepta en caso de ausencia de alternativas terapéuticas más seguras. En madres lactantes se recomienda la suspensión de la lactancia materna o evitar la administración del medicamento.*
- *Este medicamento contiene sacarosa como excipiente, por lo que deberá ser tenido en cuenta en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, problemas de absorción de glucosa, deficiencia de sacarasa-isomaltasa y pacientes diabéticos.*

#### **EFFECTOS ADVERSOS**

- *Son, en general, infrecuentes y reversibles con la reducción de la dosis o la retirada del tratamiento. Raramente puede aparecer somnolencia, vértigos, confusión, insomnio o alteraciones sanguíneas.*

#### **RECOMENDACIONES**

- *En caso de insuficiencia renal se recomienda ajustar la posología en función del grado de insuficiencia.*