
TESTOSTERONA pomada al 2 %

COMPOSICIÓN

Propionato de testosterona.....	2 g
Vaselina filante.....	88 g
Vaselina líquida.....	10 g

Conservación

Refrigerado, protegido de la luz

Caducidad

6 meses

Administración

Tópica

MODUS OPERANDI

- 1.- Mezclar el propionato de testosterona y la vaselina líquida, homogeneizar en mortero.
- 2.- Colocar la vaselina filante sobre la placa de mármol e ir incorporándole la mezcla anterior, poco a poco mediante espátula y dilución geométrica.
- 3.- Dejar reposar 30 minutos antes de envasar.

INDICACIONES

Hipogonadismo masculino, criptorquismo, torsión bilateral

OBSERVACIONES

BIBLIOGRAFÍA

- 1.- Manual de Fórmulas Magistrales y Normalizadas, Son Dureta, P. Mallorca, 1992
- 2.- Martindale. The complete Drug Reference, 32 ed. Pharmaceuticals Press .Massachusetts.1999; 1464.
- 3.- Atienza Fernández M, Lluch Colomer A, Martínez Atienza J y Santos Rubio MD. Formulación en Farmacia Pediátrica. 1ª Ed: Litografía Sevillana. 2001.
- 4.- Atienza Fernández M, y Martínez Atienza J. Formulación en Farmacia Pediátrica. 2ªEd: Litografía Sevillana. 2002.
- 5.- Drugdex drug evaluations. Micromedex® Healthcare Series, Vol 123, 2005.

Membrete
o sello de la Farmacia

TESTOSTERONA gel y pomada al 2%

INFORMACIÓN AL PACIENTE

INDICACIONES

- *Hipogonadismo masculino, criptorquismo y torsión bilateral.*

CONSERVACIÓN

- *Refrigerado y protegido de la luz.*

MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS QUE NO DEBE TOMAR

- *Indique a su médico si está en tratamiento con insulina, fenilbutazona, propranolol o corticoides.*

¿CÓMO DEBE ADMINISTRAR ESTE MEDICAMENTO?

- *Aplicar sobre piel limpia y seca en las zonas que se le indique (generalmente se aplica en abdomen, espalda, parte alta de los brazos o de los muslos).*
- *Dejar que la zona de aplicación se seque antes de cubrirla con la ropa.*
- *Lávese las manos cuidadosamente después de aplicarlo.*
- *Espere al menos 6 horas después de aplicarlo para ducharse o mojar la zona.*
- *Si olvida aplicar una dosis aplíquela tan pronto como se acuerde, salvo que quede poco tiempo para la próxima administración, en ese caso ignore la dosis olvidada.*

¿CUÁNDO NO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

- *Cuando haya sufrido previamente una reacción alérgica a testosterona.*

PRECAUCIONES

- *No aplicar sobre heridas o piel dañada.*
- *Diabetes, enfermedad renal, hepática, cardíaca o pulmonar.*
- *Si la pomada entra accidentalmente en contacto con la piel de otras personas lavar con abundante agua y jabón tan pronto como sea posible.*
- *Contraindicado en embarazo y lactancia. Se recomienda a las pacientes en edad fértil que tomen medidas anticonceptivas eficaces durante todo el tratamiento y algún tiempo después del mismo.*

EFFECTOS ADVERSOS

- *Frecuentemente reacción local, erupción cutánea y picor. Más raramente cefalea, acné, fatiga y nerviosismo.*

RECOMENDACIONES

- *En tratamientos de larga duración se deben realizar controles sanguíneos periódicos.*