

---

## TETRACAINA piruletas 0,2 %

### COMPOSICIÓN

Sacarosa.....100 g  
Tetracaína clorhidrato.....0,2 g

#### Conservación

Congelado

#### Caducidad

6 meses

#### Administración

Tópica

### MODUS OPERANDI

- 1.- Preparar los moldes de las piruletas : Los huecos de la placa de acero inoxidable se impregnan de aceite para impedir que el caramelo se pegue y se les coloca un palillo de madera que también se puede colocar inmediatamente después de verter el caramelo.
- 2.- Pesar la sacarosa y colocarla en el cazo. Calentar sin dejar de mover con una varilla.
- 3.- Esperar a que se forme el color caramelo característico, y antes de retirar del calor, añadir lentamente y removiendo con una varilla de vidrio la tetracaína, que previamente se ha disuelto en la mínima cantidad de agua (5 ml).
- 4.- Se aparta la mezcla del calor y se espera a que deje de hervir. Verterla a continuación sobre los moldes. Esperar que solidifique bien.
- 5.- Separar cuidadosamente las piruletas de los moldes.
- 6.- Envasar en bolsas de plástico, previamente impregnadas en su interior con esencia de limón mediante una varilla de vidrio.
- 7.- Termosellar, etiquetar y guardar en el congelador.

### INDICACIONES

Anestesia en mucosa oral lesionada.

### OBSERVACIONES

- El caramelo deberá permanecer en mucosa oral alrededor de un minuto, retirándose a continuación.
- También puede conservarse a temperatura ambiente durante 1 mes, protegido de la luz.

### BIBLIOGRAFÍA

- 1.- Buzo Sánchez G. et al. Caramelos anestésicos de tetracaína. Utilización en pediatría. XXXVII Congreso Nacional de la SEFH.
- 2.- Atienza Fernández M, Lluch Colomer A, Martínez Atienza J y Santos Rubio MD. Formulación en Farmacia Pediátrica. 1ª Ed: Litografía Sevillana. 2001.
- 3.- Atienza Fernández M, y Martínez Atienza J. Formulación en Farmacia Pediátrica. 2ªEd: Litografía Sevillana. 2002.
- 4.- Drugdex drug evaluations. Micromedex® Healthcare Series, Vol 123, 2005.

---

Membrete  
o sello de la Farmacia

## **TETRACAÍNA piruletas al 0,2%**

### **INFORMACIÓN AL PACIENTE**

#### **INDICACIONES**

- *Anestesia en mucosa oral lesionada.*

#### **CONSERVACIÓN**

- *Congelada.*

#### **MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS QUE NO DEBE TOMAR**

- *Indique a su médico si está en tratamiento con otros medicamentos.*

#### **¿CÓMO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?**

- *El caramelo deberá permanecer en la mucosa oral alrededor de un minuto, retirándose a continuación.*

#### **¿CUÁNDO NO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?**

- *Cuando haya sufrido previamente una reacción alérgica a tetracaína u otros anestésicos locales como mepivacaína o prilocaína debido al riesgo de alergia cruzada.*

#### **PRECAUCIONES**

- *Uso precautorio en embarazo y lactancia.*
- *Epilepsia, insuficiencia hepática, renal o cardíaca.*
- *Los niños pueden presentar una mayor probabilidad de que se produzca toxicidad sistémica.*

#### **EFEKTOS ADVERSOS**

- *Los más característicos son excitación, agitación, mareos, visión borrosa, náuseas, vómitos o temblores.*

#### **RECOMENDACIONES**

- *No es recomendable la aplicación sobre áreas inflamadas o infectadas, ya que puede modificarse el efecto anestésico.*